



# PRZYGOTOWANIE DO BADANIA GASTROSKOPII

## » 7 dni przed badaniem:

- ☑ Należy przerwać przyjmowanie preparatów żelaza.
- ☑ Osoby przyjmujące leki przeciwplatekcyjne jak: kwas acetylosalicylowy (np. Acard, Polocard, Aspirin Cardio itp.), tiklopidyna (Aclostin), tikagrelor (Brilique), prasugrel (np. Bewim, Efiend) i/lub leki przeciwzakrzepowe jak: dabigatran (np. Pradaxa, Telexer, Mirexan, Daxanlo itp.), apiksaban (Eliquis), rywaroksaban (np. Xarelto, Xanirva, Mibrex itp.), acenokumarol (np. Sintrom) warafaryna (Warin), heparyna (np. Clexane, Neoparin, Fraxmin, Fraxiparine, Fraxodi) powinny skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie celem ustalenia sposobu ich dawkowania, potrzeby i czasu odstawienia lub zamiany na inny lek.

## » W dniu badania

- ☑ Na 6 godzin przed badaniem nie należy nic jeść, pić kolorowych i gęstych płynów (kawa, soki, mleko, jogurty), palić papierosów, żuć gumy. Dopuszcza się picie niegazowanej wody w ilości nie większej niż 250 ml (1 szklanka) do 3 godzin przed badaniem.
- ☑ Należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe. Wyjątek stanowią leki obniżające stężenie glukozy we krwi, stosowane przez osoby z cukrzycą.
- ☑ Osoby chorujące na cukrzycę powinny wykonywać badanie w godzinach porannych. Wówczas pacjent nie przyjmuje leków przeciw cukrzycowych i insuliny w dniu badania, ale przynosi je ze sobą łącznie ze śniadaniem. Będzie mógł je przyjąć ok. 30 minut po badaniu.

## » Po badaniu:

- ☑ Nie należy jeść, pić oraz palić do czasu ustąpienia znieczulenia gardła (zwykle 30-60 minut).

## » Badanie w znieczuleniu dożylnym - analgesedacja:

- ☑ Po podaniu dożylnie środka usypiającego pacjent zasypia na czas badania i budzi się po jego zakończeniu.
- ☑ Po badaniu można jeść dopiero od momentu wskazanego przez anestezjologa.
- ☑ W zależności od decyzji anestezjologa Pacjent przebywa na terenie oddziału od 30 minut do 2 godzin.
- ☑ Z uwagi na zastosowane znieczulenie w trakcie badania - Pacjent musi opuścić oddział pod opieką pełnoletniej osoby towarzyszącej.
- ☑ Nie należy prowadzić pojazdów i podejmować ważnych z punktu prawnego decyzji minimum 12 godzin po znieczuleniu.

☎ 22 23 07 007

www.enel.pl

enel-med

#zdrowiej