



PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPII

» 7 dni przed badaniem:

- ☑ Należy przerwać przyjmowanie preparatów żelaza.
- ☑ Osoby przyjmujące leki przeciw płytkowe jak: kwas acetylosalicylowy (np. Acard, Polocard, Aspirin Cardio itp.), tiklopidyna (Aclostin), tikagrelor (Brilique), prasugrel (np. Bewim, Efiend) i/lub leki przeciwzakrzepowe jak: dabigatran (np. Pradaxa, Telexer, Mirexan, Daxanlo itp.), apiksaban (Eliquis), rywaroksaban (np. Xarelto, Xanirva, Mibrex itp.), acenokumarol (np. Sintrom) warafaryna (Warin), heparyna (np. Clexane, Neoparin, Fragmin, Fraxiparine, Fraxodi) powinny skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie celem ustalenia sposobu ich dawkowania, potrzeby i czasu odstawienia lub zamiany na inny lek.

» 5 dni przed badaniem:

- ☑ Nie należy spożywać w żadnej postaci świeżych owoców i warzyw pestkowych, tj. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek oraz pestek, siemienia lnianego i maku oraz ziarnistego/ciemnego pieczywa. Pestki i nasiona mogą przykleić się do powierzchni jelita i utrudniać ocenę w trakcie badania.

» 1-2 dni przed badaniem:

- ☑ Nie należy spożywać świeżych owoców, warzyw, ziarnistego/ciemnego pieczywa i innych produktów z dużą zawartością błonnika. Można spożywać takie produkty jak buliony, kisiele, kleiki, ryż, białe pieczywo, klarowne płyny (herbata, kawa bez mleka, woda niegazowana).

! OD MOMENTU ROZPOCZĘCIA PRZYGOTOWANIA JELITA DO BADANIA ZABRONIONE JEST PRZYJMOWANIE **JAKICHKOLWIEK POŚLĘKÓW!**
WODĘ NIEGAZOWANĄ MOŻNA PIĆ DODATKOWO OPRÓCZ PREPARATU DO OCZYSZCZANIA JELITA
● DO 3 GODZIN PRZED BADANIEM **W ILOŚCI 250 ML (1 SZKLANKA)!**

☎ 22 23 07 007

www.enel.pl

enel-med

#zdrowiej

» Przygotowanie preparatów

CITRA FLEET

Jedną saszetkę preparatu CitraFleet należy wsypać do 150 ml zimnej wody. Mieszać ok. 2-3 minuty, do rozpuszczenia proszku. Jeżeli się rozgrzeje, należy poczekać, aż ostygnie. Zawiesinę należy wypić dopiero po dokładnym rozpuszczeniu proszku. Picie niegazowanej wody rozpocznij po 10-30 minutach od wypicia rozpuszczonego leku. Konieczne jest wypicie 2 litrów wody po pierwszej dawce rozpuszczonego leku. Wodę koniecznie należy wypić w ciągu 2-3 godzin. Wszystkie wymienione czynności powtórz jeszcze raz używając drugiej saszetki leku CitraFleet. Pełne przygotowanie to wypicie 2 dawek leku i 4 litrów niegazowanej wody (2x2 litry).

EZICLEN

Jedną butelkę preparatu EZICLEN wlewamy do dołączonego kubka i uzupełniamy wodą do kreski zaznaczonej na kubku (0,5 litra). Lek spokojnie wypijamy w przeciągu 30 - 60 minut. Następnie w ciągu godziny wypijamy jeszcze 1 litr wody niegazowanej. W podobny sposób przyjmujemy drugą dawkę leku i wypijamy 1 litr wody.

CLENSIA

Należy przygotować pierwszą porcję leku, rozpuszczając 2 saszetki A i 2 saszetki B w 1 litrze wody i wypić tak przygotowany roztwór w ciągu 1 do 1,5 godziny. Ponadto należy wypić dodatkową porcję co najmniej 0,5 litra wody w ciągu następnej godziny. W podobny sposób przygotowujemy drugą porcję leku.

MOVIPREP

Lek MOVIPREP składa się z dwóch porcji - pierwszą porcję (saszetka A + saszetka B) rozpuszczamy w 1 litrze wody, spokojnie wypijamy w ciągu 1-2 godzin, a w ciągu następnej godziny dopijamy jeszcze 1 litr wody niegazowanej. Tak samo postępujemy z drugą porcją (saszetka A + saszetka B).

FORTTRANS

Należy przygotować 4 litry roztworu preparatu Fortrans, rozpuszczając każdą z 4 saszetek w 1 litrze niegazowanej wody.



PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPII uwzględniające godzinę badania

» Badanie w godzinach 8.00 – 12.00

PIERWSZĄ PORCJĘ PREPARATU (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l roztworu FORTRANS należy wypić od godz. 17.00 do 20.00 w dniu poprzedzającym badanie.

DRUGĄ PORCJĘ PREPARATU (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l roztworu FORTRANS należy wypić od godz. 21.00 do 24.00 w dniu poprzedzającym badanie.

» Badanie w godzinach 12.00 – 16.00

PIERWSZĄ PORCJĘ PREPARATU (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l roztworu FORTRANS należy wypić od godz. 21.00 do 24.00 w dniu poprzedzającym badanie.

DRUGĄ PORCJĘ PREPARATU (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l roztworu FORTRANS należy wypić od godz. 06.00 do 09.00 w dniu badania.

» Badanie w godzinach 16.00 – 20.00

PIERWSZĄ PORCJĘ PREPARATU (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l roztworu FORTRANS należy wypić od godz. 06.00 do 09.00 w dniu badania.

DRUGĄ PORCJĘ PREPARATU (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l roztworu FORTRANS należy wypić od godz. 10.00 do 13.00 w dniu badania.

» W dniu badania:

- ✔ Pacjent powinien zgłosić się 30 minut przed wyznaczonym terminem do recepcji z dokumentem tożsamości, skierowaniem i aktualnymi badaniami.
- ✔ Pacjent powinien poinformować lekarza o przyjmowanych lekach oraz posiadać ze sobą dokumentację wcześniej wykonanych badań endoskopowych.
- ✔ Jeżeli pacjent przyjmuje leki istotne dla zdrowia – nasercowe, przeciwnadciśnieniowe, antyarytmiczne, tarczycowe, przeciwdrgawkowe, przeciwastmatyczne – powinien je przyjąć, popijając niewielką ilością (maks. ½ szklanki) niegazowanej wody o godzinie 6.00.
- ✔ Osoby chorujące na cukrzycę powinny wykonywać badanie w godzinach porannych. Wówczas pacjent nie przyjmuje dawek wieczornych leków p/ cukrzycowych i insuliny. Nie przyjmuje ich również w dniu badania, ale przynosi je ze sobą łącznie ze śniadaniem. Będzie mógł je przyjąć po badaniu.
- ✔ Nie należy palić papierosów i żuć gumy.

» Po badaniu:

- ✔ Po zakończeniu badania można jeść, obowiązuje dieta lekkostrawna. Jeśli pojawi się dyskomfort – wzdęcia, kurczowe bóle brzucha – należy zastosować Espumisan lub No-Spa.

» Badanie w znieczuleniu dożylnym - analgosedacja:

- ✔ Po podaniu dożylnie środka usypiającego pacjent zasypia na czas badania i budzi się po jego zakończeniu.
- ✔ Po badaniu można jeść dopiero od momentu wskazanego przez anestezjologa.
- ✔ W zależności od decyzji anestezjologa Pacjent przebywa na terenie oddziału od 30 minut do 2 godzin.
- ✔ Z uwagi na zastosowane znieczulenie w trakcie badania - Pacjent musi opuścić oddział pod opieką pełnoletniej osoby towarzyszącej.
- ✔ Nie należy prowadzić pojazdów i podejmować ważnych z punktu prawnego decyzji minimum 12 godzin po znieczuleniu.

📞 22 23 07 007

www.enel.pl

enel-med

#zdrowiej